


I SIMPOSIO INTERNACIONAL MEFAVILA 2025

Síndrome Post-Chikungunya en Supervivientes de Cáncer

Actores: Dr. Carlos David Boris Miclín¹, Yonathan Estrada Rodríguez², DrC. María Eugenia García Céspedes³.

1. Residente de primer año de Cardiología Clínica. Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Docente Saturnino Lora, Santiago de Cuba, Cuba.
2. Estudiante de sexto año de Medicina. Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas. Facultad de Ciencias Médicas Dr. Juan Guiteras Gener, Matanzas, Cuba.
3. Especialista en primer y segundo grados Medicina Interna. Hospital General Dr. Juan Bruno Zayas Alfonso, Cuba. , Santiago de Cuba, Cuba.

Introducción: la fiebre chikungunya es una enfermedad viral transmitida por mosquitos, caracterizada por fiebre alta y artralgias debilitantes. Un porcentaje significativo de pacientes desarrolla un síndrome post-chikungunya crónico, con artritis persistente, fatiga severa y mialgias que pueden durar meses o años. Los supervivientes de cáncer constituyen una población de especial vulnerabilidad debido a secuelas del tratamiento oncológico (como neuropatía, fatiga crónica, deterioro inmunológico o daño articular previo). Es crucial entender las características clínicas y la carga de esta comorbilidad para desarrollar protocolos de manejo integral y multidisciplinario.



Objetivo: describir las características clínicas y el impacto en la calidad de vida del síndrome post-chikungunya en supervivientes de cáncer.

Método: estudio observacional, descriptivo y transversal en supervivientes de cáncer diagnosticados de infección aguda por chikungunya confirmada por laboratorio en los últimos 6-18 meses. Se incluyeron los que tienen una historia oncológica documentada y síntomas persistentes compatibles con chikungunya (artralgias/artritis, fatiga, etc.).

Resultados: los pacientes con neuropatía previa por quimioterapia reportaron dolor neuropático superpuesto significativamente mayor. La fatiga oncológica previa se exacerbó en el 95% de los casos. Respecto al manejo farmacológico se destaca la alta frecuencia de polifarmacia y preocupación por interacciones entre analgésicos/antiinflamatorios y terapias oncológicas de mantenimiento.

Discusión: la artritis post-chikungunya puede ser más severa y de manejo más complejo en pacientes con daño articular previo por terapias oncológicas. La fatiga crónica emerge como el síntoma más incapacitante y difícil de abordar, requiriendo un enfoque de rehabilitación integral. Se evidencia la necesidad de un enfoque de medicina dual: reumatología-oncología, junto con apoyo de fisioterapia, psicología y manejo del dolor.

Conclusiones: el síndrome post-chikungunya en supervivientes de cáncer se presenta con una sintomatología severa y persistente, que interactúa negativamente con las secuelas oncológicas siendo una comorbilidad que conlleva un deterioro significativo de la calidad de vida y un aumento del riesgo de afectación psicosocial.



Es imperativo integrar el seguimiento de esta condición en los planes de cuidado de largos supervivientes de cáncer en zonas endémicas, mediante equipos multidisciplinarios por lo tanto se requieren guías clínicas específicas para el manejo seguro de la sintomatología musculoesquelética y la fatiga en este grupo de alta vulnerabilidad.

Referencias bibliográficas: Caracterización clínica y epidemiológica de la epidemia de Chikungunya en el Paraguay. ANALES [Internet]. 2023 Aug. 22 [cited 2025 Dec. 11];56(2):18-26. Available from: <https://revistascientificas.una.py/index.php/RP/article/view/3669>

