

Título: Manifestaciones cutáneas del Chikungunya simulando Síndrome de Steven Johnson pediátrico. Reporte de un caso.

Dr. Adrian Isacc Nieto Jiménez. Especialista en II grado en Dermatología.

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-1925-6407>. Correo: adrianisacnj@gmail.com

Hospital Provincial Pediátrico Universitario José Luis Miranda. Villa Clara. Cuba.

Introducción: La fiebre del Chikungunya es una enfermedad viral causada por el virus Chikungunya. Entre las manifestaciones cutáneas atípicas se describen lesiones ampollares en niños en fase aguda. Por lo anterior se presenta el siguiente caso clínico pediátrico, por su baja incidencia en Villa Clara y escasos reportes sobre estas formas clínicas, simulando otras enfermedades ampollares infantiles, con el **objetivo** de considerar las manifestaciones cutáneas del CHIKV como diagnóstico diferencial del síndrome de Steven Johnson en la infancia.

Presentación del caso: Paciente F, B de 12 años de edad, procedente de área rural, con APP de aparente salud. Hospitalizada en el servicio de Terapia Intensiva con diagnóstico presuntivo de Síndrome de Steven Johnson. Había iniciado con fiebre de 6 días de evolución y lesiones cutáneas ampollas, eritematosas y descamativas que evolucionaron a una eritrodermia. En el momento de la valoración presentaba mejoría parcial. Afectación solo de mucosa oral. Se indicaron complementarios con Leucocitosis a predominio linfocitario.



Figura 1



Figura 2



Figura 3

Discusión: Ante este cuadro cutáneo extenso, ya mejorado parcialmente se discute la posibilidad de: Manifestación cutánea atípica del CHIKV simulando un síndrome de Steven Johnson, considerando la ausencia de criterios para plantear este síndrome propiamente dicho confirmado por biopsia cutánea.. La paciente evolucionó favorablemente, egresada a los 12 días. Esta dermatosis secundaria al CHIKV se describe en la literatura internacional como una forma clínica rara de esta entidad en edad pediátrica. El manejo en estos pacientes es multidisciplinario, no debe faltar el criterio de un dermatólogo pediátrico experto. Las lesiones cutáneas se tratan según el estado de la piel, con compresas y baños antisépticos.

Conclusiones: Ante lesiones ampollas en la infancia, con ausencia de criterios para enfermedades ampollares, hay que considerar las manifestaciones cutáneas del CHIKV, esto garantiza una adecuada conducta y rápido manejo del paciente. Es importante la valoración por Dermatología Pediátrica.